

CITO TEST® ROTA-ADENO

Застосування: CITO TEST ROTA-ADENO – експрес-тест для якісного виявлення антигенів ротавірусів і аденовірусів у зразках фекалій.

Загальна інформація: Ротавіруси та аденовіруси є основними збудниками інфекційних гастроентеритів як у дітей (в тому числі немовлят), так і дорослих.

Основний механізм передачі інфекції – фекально-оральний, може передаватися через брудні руки, з водою, харчовими продуктами, предметами побуту.

Симптоми вірусного гастроентериту: діарея, блювання, кишкові кольки, лихоманка, головний біль. Симптоми розвиваються протягом 1-2 днів та тривають до 10 днів, в залежності від того який вірус є причиною захворювання: ротавірусна інфекція – до 7 днів, аденовірусна інфекція до 10 днів.

Важливо!!! Ротавірусна інфекція – найнебезпечніша кишкова інфекція для дітей!!!¹


Переваги тесту:

- **швидко:** результат через 10 хв.
- **зручно** (в домашніх умовах!)
- висока **точність результату – більше 99%** (чутливість CITO TEST ROTA більше 99%, специфічність – 98%)²


Комплектація:

- тест
- пробірка з буфером
- інструкція

Процедура тестування



Інтерпретація результатів:



Умови зберігання: Зберігати тест запакованим при температурі 2-30°C. Термін зберігання - 24 міс. Не заморожувати!

1. Т. к. ротавірус являється причиною до 20% смертей, зв'язаних з гастроентеритом (это 5-10 млн. смертей в год)

Микробиология, вирусология, иммунология. - под ред. В.П. Широкова. Нова книга - Винница., 2015, 855 с.

<https://emedicine.medscape.com/article/176515-overview#a>

2. Інструкція до CITO TEST Rota-Adeno